

L'essentiel de l'Épisode 2:

LE PORT DE GANTS

LES INDICATIONS DU PORT DE GANTS :

Les gants sont indiqués en cas de :

✓ Risque d'exposition à du sang ou des liquides biologiques

✓ Contact avec les muqueuses ou la peau lésée des patients

✓ Lésions sur les mains des soignants

✓ Exposition à des produits chimiques

Précautions
standard

✓ Prise en charge d'un patient avec des agents pathogènes particuliers : *Sarcoptes scabiei* (gale) et *Clostridioïdes difficile*.

PC

BONNES PRATIQUES :

Hygiène des mains (SHA)
AVANT

Hygiène des mains (SHA
ou LS si transpiration)
APRÈS



Port de gants

1 paire de gants
=
1 soin
=
1 patient

Retrait de gants



OU



Mes notes :

PORT DE GANTS :



1. Prélever un gant de soins de son emballage d'origine.



2. Ne toucher qu'une surface limitée du gant correspondant au poignet (bord supérieur du gant).



3. Enfiler le premier gant.



4. Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu'une surface limitée du second gant, correspondant au poignet.



5. Afin de ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main gantée, retourner la surface externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée, permettant ainsi d'enfiler le gant sur la seconde main.




6. Une fois les gants enfilés, les mains ne touchent rien d'autre que ce qui est défini par les indications et les conditions d'usage des gants.

RETRAIT DES GANTS :



1. Pincer un gant au niveau du poignet afin de le retirer sans toucher la peau de l'avant-bras, en le retournant sur la main, de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur.



2. Tenir le gant retiré dans la main gantée et glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le poignet de l'autre main. Retourner le gant depuis l'intérieur sur la main de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur, tout en enveloppant le gant déjà retiré.



3. Jeter les gants usagés.
Filières DAOM ou DASRI en cas de risque infectieux.

Mes notes :