

# Prise en charge de patients/résidents immunodéprimés infectés par la COVID-19 en ES/EMS

## 1 ENJEUX

1. Pendant la phase aiguë de la COVID-19 et jusqu'à la guérison\* :
  - a. casser la chaîne de transmission
  - b. prévenir la transmission croisée
2. Après la guérison :
  - a. concilier la reprise d'une activité du patient/résident guéri en garantissant l'absence de prise de risque pour les professionnels et les autres patients/résidents de l'établissement.

La démarche consiste à identifier l'ensemble des points critiques, organiser & adapter les mesures barrières pour casser la chaîne de transmission et éviter d'en recréer une au sein de la collectivité.

## 2 GUERISON\*

La guérison chez la personne immunodéprimée repose sur 2 critères :

- Critères cliniques à J14 du début des symptômes **ET au moins 48 heures après disparition de la fièvre (mesurée 2x/j et absence d'antipyrétiques d'au moins 12 heures) ET au moins 48 heures après disparition d'une éventuelle dyspnée (fréquence respiratoire < 22/min au repos)**
- et RT-PCR de contrôle à J14 : CT  $\geq$  33 (= n'est plus contagieuse). Si CT < 33  $\rightarrow$  contrôle à J21

## 3 MODALITES DE PRISE EN CHARGE

### PERSONNEL SOIGNANT

J0 à J14\*

Met en place et respecte les mesures COVID

Après J14\*

Levée des mesures COVID

**Sont considérés comme immunodéprimés (ID), les personnes à risque de forme grave :**  
ID congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie, corticothérapie à dose immunosuppressive), infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm<sup>3</sup>, ID consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, ID liée à une hémopathie maligne en cours de traitement

### PATIENT/RÉSIDENT

J0 à J14\*

Reste en chambre. Seules les sorties sur prescription médicale sont autorisées.

Après J14\*

Peut quitter sa chambre :

- **Idéalement, porte du masque chirurgical dès qu'il quitte la chambre**
- **Réalise une hygiène des mains :**
  - dès la sortie de la chambre,
  - après s'être mouché et avoir éliminé son mouchoir,
  - après avoir toussé, craché si le geste n'a pas été fait dans la manche
  - régulièrement pendant le déplacement,
  - avant et après accès à des espaces partagés,
  - dès qu'il rejoint la chambre
- Privilégier la désinfection des mains par friction aux solutions hydro-alcooliques (SHA), à défaut avec des mains à l'eau et au savon doux : autonome, le résident réalise seul son hygiène des mains, non autonome, massage à 4 mains
- **Respecte idéalement la distanciation sociale :**
  - avec les autres patients/résidents et dans tous les espaces partagés : couloir, ascenseur, escalier, patio, salle à manger



### VISITEUR

J0 à J14\*

Visites non autorisées sauf autorisation médicale

Après J14\*

Visites autorisées en respectant systématiquement :

Port de masque chirurgical & Hygiène des mains & Distanciation physique